### Медицинская помощь

## Профилактика туберкулеза

### Кому проводить диагностику туберкулеза

Диагностику туберкулеза должны проходить все дети старше 1 года, с шести месяцев – если нет прививки против туберкулеза (пп. 817, 818 и 825 СанПиН 3.3686-21). Результаты диагностики подтверждают, что ребенок болен или здоров. Без отрицательных результатов диагностики или заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания посещать детский сад запрещено (абз. 2 п. 823 СанПиН 3.3686-21).

# Ситуация. Надо ли делать пробу Манту, если у ребенка есть прививка от туберкулеза

Да, надо. Проба и прививка – не одно и то же. Прививку делают, чтобы у ребенка выработался иммунитет к туберкулезу, а в случае заражения – значительно снизить риск заболевания или осложнений (ст. 1 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ). Пробу делают, чтобы проверить, что ребенок имеет иммунитет или не болен туберкулезом.

### Какие применять методы диагностики туберкулеза



#### Внимание

За допуск в группу ребенка, который не прошел диагностику туберкулеза, ДОО могут оштрафовать

Для диагностики туберкулеза применяют основные и альтернативные методы (п. 2.5 Клинических рекомендаций от 18.09.2024). Выбор метода зависит от возраста ребенка, наличия у него противопоказаний и согласия на диагностику.

**Основные методы.** Для детей от 1 года до 7 лет включительно приоритетный метод диагностики — постановка внутрикожной пробы Манту с туберкулезным аллергеном (подп. «а» п. 8 Порядка, утв. приказом Минздрава от 21.03.2021 № 124н). Манту позволяет выявить ранний период первичного туберкулёзного инфицирования, дает допуск детям 6 — 7 лет на ревакцинацию против туберкулеза.

Если у детей есть чувствительность к туберкулину, например установлена поствакцинальная аллергия, Манту заменяют на Диаскинтест (п. 2.5.1 Клинических рекомендаций от 18.09.2024). Диаскинтест — зарегистрированное наименование внутрикожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР). В отличие от Манту, которое содержит убитые бактерии заболевания, Диаскинтест содержит только белки антигена.